

DIFFU-K gélules

Composition

Chlorure de potassium microencapsulé... 600,00 mg (correspondant à 8 mEq de potassium)

Excipients : Stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium – pour 1 gélule

Composition de la gélule : gélatine, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

Forme pharmaceutique

Gélules dosées à 600 mg, boîte de 40.

Classe pharmaco-thérapeutique

Potassium (A : appareil digestif et métabolisme)

Nom et adresse de l'exploitant

UCB Pharma S.A.

Défense Ouest

420, rue d'Estienne d'Orves

92700 Colombes

Tél. 01.47.29.44.35

Fabricant

NEXTPHARMA S.A.S

17, route de Meulan

78520 Limay

Dans quels cas utiliser ce médicament

Ce médicament est indiqué dans le traitement et la prévention des déficits en potassium.

ATTENTION

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

Hyperkaliémie ou toute situation pouvant entraîner une hyperkaliémie (taux anormalement élevé de potassium dans le sang), en particulier : insuffisance rénale, syndromes addisoniens, diabète non contrôlé, myotonie congénitale, traitement en association avec certains antihypertenseurs (certains diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

Des analyses de sang sont nécessaires avant et pendant le traitement afin d'adapter la posologie, notamment chez la personne âgée.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS et notamment avec certains antihypertenseurs (certains diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion), le tacrolimus,

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Comment utiliser ce médicament

Posologie

A titre indicatif

- traitement préventif : 2 à 3 gélules par jour

- traitement curatif : 5 à 12 gélules par jour

- la posologie est adaptée par votre médecin en fonction de l'analyse de sang.

SE CONFORMER A L'AVIS MEDICAL.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avaler les gélules avec un verre d'eau.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Le surdosage expose aux risques d'hyperkaliémie. Prévenir immédiatement un médecin.

Effets non souhaités et gênants

Hyperkaliémie : celle-ci est à prévenir par le contrôle de la kaliémie.

A forte dose, possibilité d'ulcération digestive.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant en clair sur le conditionnement extérieur.

Date de révision de la notice

Décembre 2008



IN ORDER TO PREVENT POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL MEDICINES, and particularly with certain antihypertensives (certain diuretics and ACE inhibitors) or tacrolimus, YOU MUST SYSTEMATICALLY INFORM YOUR DOCTOR OR