

Tanganil Gé 500 mg

comprimé

Acétylleucine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **Tanganil Gé 500 mg, comprimé** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **Tanganil Gé 500 mg, comprimé** ?
3. Comment prendre **Tanganil Gé 500 mg, comprimé** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **Tanganil Gé 500 mg, comprimé** ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Tanganil Gé 500 mg, comprimé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIVERTIGINEUX.

Ce médicament est préconisé dans le traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Tanganil Gé 500 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais Tanganil Gé 500 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Allergie connue à l'acétylleucine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec Tanganil Gé 500 mg, comprimé

Ce médicament peut être administré en cas de maladie coeliaque. L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de Tanganil Gé 500 mg, comprimé :

Ce médicament contient de l'amidon de blé (voir les paragraphes "Ne prenez jamais Tanganil Gé 500 mg, comprimé, dans les cas suivants" et "Faites attention avec Tanganil Gé 500 mg, comprimé").

3. COMMENT PRENDRE Tanganil Gé 500 mg, comprimé ?

Posologie

Chez l'adulte

Fréquence d'administration

En moyenne 3 à 4 comprimés, en 2 prises matin et soir.

Durée du traitement

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique ; au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez pris plus de Tanganil Gé 500 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Tanganil Gé 500 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **Tanganil Gé 500 mg, comprimé** est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Des réactions cutanées (éruptions, rougeurs, urticaire et démangeaisons) ont été très rarement observées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER Tanganil Gé 500 mg, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser **Tanganil Gé 500 mg, comprimé** après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Tanganil Gé 500 mg, comprimé ?

- **La substance active est** : Acétylleucine 500 mg. Pour un comprimé.
- **Les autres composants sont** : Amidon de blé, amidon de maïs pré-gélatinisé, carbonate de calcium, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que Tanganil Gé 500 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé blanc et oblong.
Boîte de 30 comprimés.

Titulaire/Exploitant

PIERRE FABRE MÉDICAMENT
45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

Fabricant

PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION
PROGIPHARM
Rue du Lycée - 45500 Gien

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Octobre 2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Information médicale : Tél. 0800 950 564.



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.



Pierre Fabre