

# Ossopan<sup>®</sup> 600 mg

Comprimés pelliculés

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

## **1. QU'EST-CE QUE OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

CALCIUM / ELEMENT MINERAL

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament contient du calcium.

Il est indiqué :

- en cas de carences en calcium suite à une augmentation des besoins (croissance, grossesse, allaitement)
- en traitement d'appoint des décalcifications osseuses chez le sujet âgé, ou après la ménopause, une corticothérapie, une immobilisation prolongée après reprise de la mobilité.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?**

**Ne prenez jamais OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :**

- antécédents d'allergie à l'un des constituants,

- si vous souffrez d'insuffisance rénale sévère (défaillance sévère de la fonction rénale) ou si vous êtes sous hémodialyse,
- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),
- hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans les urines),
- lithiase calcique (calcul rénal) – calcifications tissulaires,
- immobilisation prolongée s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie : le calcium ne doit être administré qu'à la reprise de la mobilité,
- enfant de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé :**

### **Mises en garde spéciales**

Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux. NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL.

### **Précautions d'emploi**

En cas de traitement prolongé ou d'insuffisance rénale (défaillance de la fonction rénale), il est nécessaire de faire contrôler le taux de calcium dans les urines et de faire contrôler le taux de calcium et de phosphore dans le sang : consultez régulièrement votre médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **3. COMMENT PRENDRE OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?**

### **Posologie**

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

#### **Adultes :**

8 comprimés par jour.

#### **Enfant de plus de 6 ans :**

4 à 8 comprimés par jour, selon les conseils de votre médecin.

## **Mode d'administration**

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

En cas de traitement prolongé à fortes doses : risque de modification du taux de calcium dans le sang ou les urines.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé ?**

**La substance active est :**

Extrait d'os total (exprimé en matière sèche) (complexe osséine-hydroxyapatite anhydre)\* ..... 600 mg

Pour un comprimé pelliculé.

\* soit 321 mg d'hydroxyapatite correspondant à : Calcium : 129 mg ou 3,24 mmol

**Les autres composants sont :**

Amidon de pomme de terre, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

**Pelliculage :** hypromellose, dioxyde de titane (E 171), macrogol 6000, oxyde de fer jaune, talc.

**Qu'est-ce que OSSOPAN 600 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30.

**Titulaire**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**

45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**Exploitant**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**

45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**Fabricant**

**SIMAPHAC**

Z.I.  
45220 CHATEAURENARD

ou

**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**

45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2010**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



Pierre Fabre

718 930



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.