

cicatryl

pommade en sachet-dose

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CICATRYL, pommade en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
3. COMMENT UTILISER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CICATRYL, pommade en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Protecteur cutané. (D : Dermatologie)

La pommade CICATRYL est utilisée pour le traitement local des plaies et brûlures

superficielles peu étendues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?

N'utilisez jamais CICATRYL pommade en sachet-dose :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans CICATRYL, pommade en sachet-dose.

Faites attention avec CICATRYL pommade en sachet-dose :

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E 216) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ces réactions allergiques sont décrites dans le paragraphe "Quels sont les effets indésirables éventuels".

Précautions d'emploi :

Comme il est d'usage pour toute plaie, un nettoyage préalable est conseillé.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER AVIS A VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CERTAINS COMPOSANTS DE CICATRYL, pommade en sachet-dose

Liste des excipients à effet notoire :

parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216).

3. COMMENT UTILISER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?

Posologie :

Se laver soigneusement les mains.

Appliquer une couche de CICATRYL sur la région de la peau concernée et la faire pénétrer par léger massage du bout des doigts.

En règle générale 1 à 2 applications par jour sur la région de la peau concernée en fonction de la nature et l'importance de la blessure ou de la brûlure.

• Si le pourtour de la plaie est irrité, faire déborder largement l'application de CICATRYL au-delà de la blessure à traiter.

• Si la blessure ou la brûlure est trop douloureuse, la recouvrir avec une gaze préalablement enduite de CICATRYL.

Voie d'administration :

Voie cutanée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CICATRYL, pommade en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- un eczéma de contact.
- une réaction allergique : (démangeaisons, rougeurs cutanées et/ou brusque gonflement du visage et du cou). Si ces réactions surviennent, vous devez arrêter le traitement et consulter rapidement un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CICATRYL, pommade en sachet-dose après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient CICATRYL, pommade en sachet-dose ?

Les substances actives sont :

Allantoïne	1,000 g
Guaiazulène	0,007 g
Para-chlorométacresol	0,120 g
Acétate d'alpha-tocophérol	0,010 g

Pour 100 g de pommade.

Les autres composants sont :

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), paraffine liquide légère, vaseline officinale, mélange d'alcool cétostéarylique (90 pour cent) et de cétyl stéaryl sulfate sodique (10 pour cent), mélange d'alcool cétostéarylique (70 pour cent) de cétyl stéaryl sulfate sodique (10 pour cent) et d'acide gras éthoxylé d'origine organique (20 pour cent), monostéarate de glycérol, macrogol glycol 400, sorbitol (solution à 70 pour cent), eau purifiée.

Qu'est-ce que CICATRYL, pommade en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pommade.

Boîte de 14 sachets de 2 g.

Titulaire / Exploitant :

PIERRE FABRE MÉDICAMENT

45, PLACE ABEL GANCE - 92100 BOULOGNE

Fabricant :

PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

SITE PROGIPHARM - RUE DU LYCEE - 45500 GIEN

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21 février 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France). Information médicale : Tél. 0800 95 05 64



Pierre Fabre