

BiCirkan

Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que BICIRKAN, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BICIRKAN, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BICIRKAN, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BICIRKAN, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE BICIRKAN, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est un veinotonique et vasculoprotecteur (entraîne une vasoconstriction, augmente la résistance des vaisseaux et diminue leur perméabilité).

Indications thérapeutiques : Il est indiqué dans : • les troubles de la circulation veineuse, • la crise hémorroïdaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BICIRKAN, comprimé pelliculé ?

Contre-indications : Ne prenez jamais BICIRKAN, comprimé pelliculé dans les cas suivants : antécédents d'allergie à l'un des constituants du comprimé. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales : Faites attention avec BICIRKAN, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- En cas de diarrhée : arrêtez votre traitement et prévenez votre médecin.
- Crise hémorroïdaire : l'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales. Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, il est indispensable de consulter votre médecin.

En cas de nausées ou de maux d'estomac, il est conseillé de prendre le produit en début de repas.

Troubles de la circulation veineuse : Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

- Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.
- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

En raison de la présence de vitamine C, éviter la prise après 16 heures.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse : Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement : L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement. Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire

Excipient à effet notoire : rouge cochenille (E 124).

3. COMMENT PRENDRE BICIRKAN, comprimé pelliculé ?

Instructions pour un bon usage

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie : La posologie doit être adaptée individuellement.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

La posologie usuelle est de 2 comprimés par jour en deux prises au cours des repas, soit 1 comprimé le matin, 1 comprimé le midi. En raison de la présence de vitamine C, éviter la prise après 16 heures.

Mode d'administration : Voie orale. Le comprimé est à avaler tel quel avec un verre d'eau au cours du repas.

Si vous avez l'impression que l'effet de BICIRKAN, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement : Ce traitement doit être suivi régulièrement. C'est votre médecin qui vous précisera la durée de votre traitement.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BICIRKAN, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre BICIRKAN, comprimé pelliculé : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BICIRKAN, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Troubles digestifs : diarrhées parfois sévères, rapidement réversibles à l'arrêt du traitement.

- Nausées, maux d'estomac.

- Rares cas d'érythèmes et d'urticares.

- En raison de la présence de rouge cochenille, risque de réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BICIRKAN, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Date de péremption : Ne pas utiliser BICIRKAN, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation : A conserver à une température ne dépassant pas +30 °C et conserver les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient BICIRKAN, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont :

Extrait sec de petit Hou	80,00 mg.
Hespéridine méthylchalcone	200,00 mg.
Acide ascorbique	400,00 mg.

Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants sont :

Comprimé nu : hypromellose, cellulose microcristalline, copovidone, crospovidone, talc, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hypromellose, éthylcellulose, triéthylcitrate, dioxyde de titane (E171), laque rouge de cochenille (E124).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que BICIRKAN, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîtes de 30 comprimés et 60 comprimés.

Titulaire / Exploitant : PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

Fabricant : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

Information médicale : 0 800 950 564

Date d'approbation de la notice : La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27 janvier 2009.

Informations Internet:

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



Pierre Fabre

716 889 - TO



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.