

EDUCTYL enfants

1 - IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DÉNOMINATION

EDUCTYL ENFANTS

b) COMPOSITION QUALITATIVE

Tartrate acide de potassium, bicarbonate de sodium, lécithine de soja, talc, glycérides hémisynthétiques solides.

COMPOSITION QUANTITATIVE

Tartrate acide de potassium 0,575 g

Bicarbonate de sodium 0,350 g

Pour un suppositoire de 2 g

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 12 suppositoires effervescents de 2 g.

d) CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

LAXATIF

(A : voies digestives et métabolisme)

e) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

LABORATOIRES TECHNI-PHARMA - 7, rue de l'Industrie - MC 98000 MONACO.

2 - DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- Traitement symptomatique de la constipation notamment en cas de dyschésie rectale (défécation difficile).
- Préparation aux examens endoscopiques du rectum.

3 - ATTENTION

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPÉCIALES

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage...). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre, doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :

Elle peut être liée à deux causes :

- Soit à une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin.
- Soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...) ;
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruit ;
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...) ;
- une rééducation du réflexe de défécation ;
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

IL EST UTILE DE PRENDRE CONSEIL AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

CAS PARTICULIER DE L'ENFANT

Chez l'enfant, le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique : notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de laits infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits. Le traitement par un laxatif par voie rectale sans avis médical est contre-indiqué (la prise régulière peut entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation).

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament en cas de fissures anales, rectocolite hémorragique (maladie chronique de l'intestin et du colon).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

d) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

4 - COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

a) POSOLOGIE


La posologie est en moyenne de 1 suppositoire par jour.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie rectale.

1. Ouverture de l'alvéole

2. Sens d'introduction du suppositoire dans le rectum.



Prédécoupe

- séparer les 2 languettes à la pointe du suppositoire
- prendre chacune entre les doigts et tirer.

Nota : ce sens d'introduction assure une excellente pénétration du suppositoire par conséquent un maximum d'efficacité.

c) FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Un suppositoire, 5 à 10 minutes avant le moment choisi pour l'exonération.

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) DURÉE DU TRAITEMENT

Selon prescription médicale.

5 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

Un usage prolongé peut donner lieu rarement à des sensations de brûlures anales et exceptionnellement à des rectites congestives.

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6 - CONSERVATION

a) **NÉ PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT**

b) **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :**

Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

7 - **DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : NOVEMBRE 2010.**



Les laboratoires TECHNI-PHARMA cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Les laboratoires TECHNI-PHARMA participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires TECHNI-PHARMA vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.