

OLIGOSTIM Cuivre-Or-Argent

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

OLIGOSTIM CUIVRE-OR-ARGENT, comprimés

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Gluconate de cuivre 0,220 mg

Quantité correspondante en cuivre 0,031 mg

Poudre d'or 0,098 mg

Argent colloïdal 0,070 mg

Excipients (lactose, croscarmellose A, stéarate de magnésium)

q.s.p. un comprimé de 100 mg

Excipient à effet notoire : lactose

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés : boîte de 40.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

OLIGOTHERAPIE

(V : Divers)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires BOIRON

20, rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

FRANCE

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours de la phase de convalescence de maladies infectieuses, d'états asthéniques.

ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament *NE DOIT PAS ETRE UTILISE* dans le cas suivant :
antécédent d'allergie à l'un des constituants.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

RÉSERVÉ À L'ADULTE. Voie orale.

1 à 2 comprimés par jour, le matin à jeun ou à distance des repas.

Laisser fondre le comprimé sous la langue.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

CE MEDICAMENT PEUT ENTRAINER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR L'ETUI.

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Mars 1999.



Les laboratoires BOIRON participent à CYCLAMED, Association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

Le dispositif mis en place par Cyclamed ne concerne que la France métropolitaine.

20, rue de la Libération

LABORATOIRES
BOIRON

69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

PRO.15P2 - 10.09