

Faites attention avec TADENAN 50 mg, capsule molle :

Mises en garde

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

Ce médicament contient de l'huile d'arachide et peut provoquer des réactions allergiques sévères.

Précautions d'emploi

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. Ce médicament ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

En cas de doute, ne pas hésiter pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

L'indication thérapeutique ne concerne pas la femme.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : Huile d'arachide.

3. COMMENT PRENDRE TADENAN 50 mg, capsule molle ?

Posologie

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

Elle est d'une capsule matin et soir à prendre de préférence avant les repas. Se conformer à l'avis médical.

Mode d'administration

Voie orale.

Se conformer à l'avis médical.

Fréquence d'administration

Se conformer à l'avis médical.

Durée du traitement

En général, le traitement est de 6 semaines et peut être prolongé à 8 semaines. Se conformer à l'avis médical.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, TADENAN 50 mg, capsule molle est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de survenue de troubles digestifs (nausées, constipation, diarrhée).

En raison de la présence d'huile d'arachide, risque de réactions allergiques (choc anaphylactique, urticaires).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TADENAN 50 mg, capsule molle ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TADENAN 50 mg, capsule molle après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TADENAN 50 mg, capsule molle ?

La substance active est :

Extrait de Prunier d'Afrique (*Pygeum africanum*) 50 mg
Pour une capsule.

Les autres composants sont :

Huile d'arachide, gélatine, glycérol, dioxyde de titane (E171), chlorophylline cuivrique hydrosoluble (E141).

Qu'est ce que TADENAN 50 mg, capsule molle et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de capsules molles. Boîte de 30 ou 60 capsules.

Titulaire

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28, boulevard Clemenceau - F 21000 Dijon

Exploitant

Abbott Products SAS

42, rue Rouget de Lisle - F 92150 Suresnes

TEL : +33. (0)1.46.25.85.00.

Fabricant

RECIPHARM FONTAINE

Rue des Prés Potets - F 21121 Fontaine-lès-Dijon

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 30 juin 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TADENAN 50 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TADENAN 50 mg, capsule molle ?
3. COMMENT PRENDRE TADENAN 50 mg, capsule molle ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TADENAN 50 mg, capsule molle ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE TADENAN 50 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS L'HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certains troubles de la miction (*émission d'urine*) liés à l'hypertrophie (*augmentation de volume*) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TADENAN 50 mg, capsule molle ?

Ne prenez jamais TADENAN 50 mg, capsule molle :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile d'arachide.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.