

MYCOHYDRALIN Clotrimazole 200 mg, comprimé vaginal

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE **MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal** ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER **MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal** ?
- COMMENT UTILISER **MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal** ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER **MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal** ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
- CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

1. QU'EST-CE QUE MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIFONGIQUE LOCAL

(G : **Système génito-urinaire et hormones sexuelles**)

Ce médicament est indiqué dans le traitement des mycoses vaginales à levures sensibles (affections dues à des champignons microscopiques). En cas d'atteinte vulvaire associé, il est recommandé de compléter le traitement vaginal par l'application d'une crème au clotrimazole à 1% sur les lésions.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal ?

N'utilisez jamais MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal : Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des constituants contenus dans MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal. Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ** avec un préservatif masculin ou un diaphragme en latex. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi

Faites attention avec MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal :

- Ne pas utiliser un savon acide pour hygiène locale (l'acidité favorisant la prolifération des champignons).
- Le traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons. Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes persistent au-delà de 24 à 48 heures, consultez votre médecin.

Mises en gardes spéciales

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable. **EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation), ni avec un préservatif ou un diaphragme en latex (risque de rupture du préservatif ou du diaphragme).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

D'une manière générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

3. COMMENT UTILISER MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal ?


Posologie, mode et voie d'administration

Voie vaginale


1 comprimé à placer au fond du vagin 3 soirs consécutifs.

Utilisez l'appliqueur pour introduire le comprimé dans le vagin de préférence le soir au coucher.

1. Sortez l'applicateur de son emballage. Tirez sur le piston (A) jusqu'à la butée. Sortez le comprimé de son blister et enfoncez-le sur 1 cm dans l'applicateur (B) de telle sorte que la partie arrondie du comprimé soit à l'extérieur de l'applicateur.



2. Placez l'applicateur à l'entrée de l'ouverture vaginale puis introduisez-le profondément dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.




3. Maintenez l'applicateur dans cette position puis presser le piston (A) de façon à déposer le comprimé dans le vagin. Retirez délicatement l'applicateur.

4. Après l'emploi, nettoyez soigneusement l'applicateur à l'eau chaude (pas bouillante).

Pour cela, retirez complètement la tige A de l'applicateur B, au-delà de la butée.

L'applicateur ne doit pas être jeté dans les toilettes.



Utilisation sans applicateur :

Après un lavage complet des mains, introduire profondément le comprimé dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

La prise de ce médicament peut entraîner exceptionnellement des brûlures locales ou une exacerbation des démangeaisons sans conséquence. **SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE**

5. COMMENT CONSERVER MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal ?

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal ?

La substance active est :

Clotrimazole..... 200 mg

Pour un comprimé vaginal

Les autres composants sont :

Lactose, amidon de maïs, acide lactique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, crospovidone, hypromellose, cellulose microcristalline, lactate de calcium.

Qu'est-ce que MYCOHYDRALIN 200 mg, comprimé vaginal et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé vaginal. Boîte de 3.

Titulaire/Exploitant
BAYER SANTE FAMILIALE
33 rue de l'Industrie
74 240 Gaillard - France

Fabricant
BAYER PHARMA AG
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen
Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11 octobre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

7. CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Conseils pratiques :

- toilette avec un savon pH neutre ou alcalin
- afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre linge de toilette (gant, serviette)
- porter des sous-vêtements en coton
- éviter les douches vaginales
- ne pas interrompre le traitement pendant les règles
- éviter de porter des tampons internes pendant le traitement
- votre médecin pourra :
 - traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine
 - vous prescrire un antifongique à appliquer localement

Bayer

