

OLIGOSTIM Fluor

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

OLIGOSTIM FLUOR, comprimés

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Fluorure de sodium	0,199 mg
Quantité correspondante en fluor	0,090 mg
Excipients (lactose, croscarmellose A, stéarate de magnésium) q.s.p. un comprimé de	100 mg
Excipient à effet notoire : lactose	

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés : boîte de 40.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

OLIGOTHERAPIE

(V : Divers)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires BOIRON

20, rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

FRANCE

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient du fluor. Il est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'atteintes ligamentaires mineures chez l'adulte.

ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans le cas suivant :
antécédent d'allergie à l'un des constituants.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

RÉSERVÉ À L'ADULTE. Voie orale.

1 à 2 comprimés par jour, le matin à jeun ou à distance des repas.

Laisser fondre le comprimé sous la langue.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Des doses supérieures à 1mg par jour peuvent occasionner l'apparition de taches jaunâtres ou brunâtres sur l'émail dentaire. En cas de surdosage, consultez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR L'ÉTIUI.

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Mars 1999.



Les laboratoires BOIRON participent à CYCLAMED, Association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

Le dispositif mis en place par Cyclamed ne concerne que la France métropolitaine.